

Ficha Técnica

CYBOR 40®

Insecticida / Polvo humectable

Uso Urbano

RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA FORMULADORA:

ALLISTER DE MEXICO S.A. DE C.V.

Circunvalación Sur ·5

C.P. 45070

Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco

Teléfonos y fax:

Tel: (33) 31 33 00 13

Fax: (33) 31 33 00 13 ext 108

Nombre comercial **CYBOR 40®**

Nombre común: **Cipermetrina**

Análisis garantizado:

Ingrediente activo	% en peso
--------------------	-----------

Cipermetrina.....	40.00
-------------------	-------

Ingredientes inertes

Vehículo y agente

estabilizador de pH.....	60.00
--------------------------	-------

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

Estado físico: Polvo fino homogéneo

Color: Blanco a beige claro

Olor: Característico (libre de solventes)

Grupo químico: Piretroide

Densidad aparente: 0.400 a 0.440 g/ml

Tiempo de humectación: No mayor a 30 seg.

pH: 9.4

INFORMACION GENERAL

CYBOR 40® es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas en edificios industriales, casas, hospitales, laboratorios, hoteles, áreas de preparación de alimentos, almacenes, jardines, bodegas, escuelas, bibliotecas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos y establos.

Su formulación, como polvo humectable, se suspende fácilmente en agua, se aplica con cualquier tipo de equipo.

No tiene olor, ni mancha paredes o ropa,. Es ligeramente tóxico.

RECOMENDACIONES DE USO

PLAGA	DOSIS	APLICACION
Piojos <i>Rhodnius prolixus</i> Chinches <i>Cimex lecturalis</i> <i>Triatoma infestans</i> Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquito <i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles spp</i> <i>Culex spp</i> Mosca <i>Musca domestica</i> <i>Stomoxys calcitrans</i> Hormiga de Faraon <i>Manomorium pharaonis</i> Hormiga de Fuego <i>Solenopsis xyloni</i> Avispa <i>Vespula sp</i>	2.5 gr/lit de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Cucaracha germánica <i>Blatella germanica</i>	5 gr./lit de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Alacrán <i>Centuroides spp</i>	5 gr./lit de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo. Para el control de cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para aplicaciones en alacrán aplicar la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

FRECUENCIA DE APLICACION

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones mas frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

TIEMPO DE REENTRADA

Espere por lo menos 30 minutos, transcurrido este tiempo ventilar el área. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

Registro: **RSCO-URB-INAC-111-358-002-40**