

FICHA TÉCNICA

		Registro COFEPRIS (México): RSCO-MEZC-URB-0156-0102U-X0009-425-33.88										
	Centro de Información Toxicológica (ATOX): 800 000 2869	CLASIFICACIÓN										
		 PLAGUICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. (permetrina, 18.55% + tiametoxam 14.83%), UN 2902										
INFORMACIÓN GENERAL												
NOMBRE COMERCIAL:	SKIPPER®											
DESCRIPCIÓN:	Insecticida de uso urbano											
INGREDIENTE ACTIVO:	Permetrina 18.55% (200 g de i.a/L) Tiametoxam 14.83% (160 g de i.a/L)											
FAMILIA QUÍMICO:	Piretroide (permetrina) + Neonicotinoide (tiametoxam)											
NOMBRE QUÍMICO:	Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilcilopropanocarboxilato Tiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno (nitro)amina El mecanismo de acción del tiametoxam es por bloqueo de la neurotransmisión, produciendo parálisis y muerte de los insectos. La permetrina, al ser liposoluble, tiene la capacidad de penetrar las áreas grasas de los insectos, produciendo un choque inmediato.											
MECANISMO DE ACCIÓN:												
FORMULACIÓN:	Suspo-emulsión											
	<table><tr><th>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</th><th>% EN PESO</th></tr><tr><td>Permetrina</td><td>18.55</td></tr><tr><td>Tiametoxam</td><td>14.83</td></tr><tr><td>Ingredientes inertes</td><td>66.62</td></tr><tr><td>Total:</td><td>100.0</td></tr></table>	COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO	Permetrina	18.55	Tiametoxam	14.83	Ingredientes inertes	66.62	Total:	100.0	
COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO											
Permetrina	18.55											
Tiametoxam	14.83											
Ingredientes inertes	66.62											
Total:	100.0											



RECOMENDACIONES DE USO:

SKIPPER® es un insecticida especialmente diseñado para el control de insectos rastreros y voladores, puede ser aplicado en interiores y exteriores de casas habitación, cocinas, baños, oficinas, bodegas, almacenes, perreras, departamentos, desvanes, hoteles, restaurantes, cafeterías, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transportes, cines, teatros, escuelas, supermercados, panaderías, parques industriales, industria alimentaria, industria farmacéutica y escuelas.

No tiene olor ni mancha paredes o ropa.

PLAGA	DOSIS mL	APLICACIÓN
Triatominos (<i>Rhodnius prolixus</i>) Chinches (<i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma infestans</i>) Pulgas (<i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>) Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>) Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>) Hormiga Faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>) Avispas (<i>Vespula spp.</i>) Arañas (<i>Latrodectus spp.</i> , <i>Loxosceles spp.</i>) Tijerillas (<i>Forficula spp.</i> , <i>Euborellia annulipes</i>) Termita de madera seca (<i>Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i>) Escarabajo de la madera (<i>Anobium punctatum</i>) Hormiga carpintera (<i>Camponotus spp.</i>) Abeja carpintera (<i>Xylocopa spp.</i>)	5-10 mL/L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos. Utilizar dosis altas en infestaciones severas.
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blatella germanica</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Alacrán (<i>Centruroides spp.</i>)	10 mL/L de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga. Para el control de la cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras.
Termitas subterráneas (<i>Heterotermes spp.</i> , <i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i>) Termitas de la madera seca (<i>Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> , <i>Kalotermes spp.</i>)	500 mL/99.5 L de agua a 1000 mL/99.0 L de agua	SKIPPER® está recomendado para la prevención y control de termitas en preconstrucción, durante la cimentación y en postconstrucción. La aplicación debe ser efectuada por controladores de plagas profesionales con el equipo adecuado.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 30 minutos.

Rendimiento: 1 litro de la mezcla rinde 33 m2

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante la manipulación del producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla con respirador, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Abra el envase cuidadosamente, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de producto indicada en esta etiqueta con una probeta. Mezcle el producto en el tanque del aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo como se indica en el apartado PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

