

FICHA TÉCNICA
Siege[®]
 Insecticida y/o Acaricida
“USO DOMÉSTICO”
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Hidrametilnona. (Equivalente a 20.8 g de i.a./kg)	2.00%
INGREDIENTES INERTES	
Formador de sal, conservador, agente gelante, solvente, atrayente, antiespumante, cosolvente.	98.00%
Total	100.00%

REG: RSCO-DOM-INAC-181-309-092-02

“INSTRUCCIONES DE USO”

La dosis de aplicación depende del nivel de infestación y de las especies a controlar:

Especie de cucaracha	Dosis de aplicación (gr/m ²) Área de superficie infestada.	Método de aplicación
Pequeñas: Germánica <i>Blattella germanica</i> Bandas cafés <i>Supella supellectilium</i>	0.25-0.50	Capa delgada o gotas pequeñas
Grandes: Americana <i>Periplaneta americana</i>	0.5-1.0	Gotas grandes



Oriental

Blatta orientalis

Café

La aplicación de la dosis baja debe ser usada para infestaciones bajas o moderadas y la dosis alta para infestaciones más severas. Los sitios de aplicación deben ser, en o cerca de cubiertas o áreas de agregaciones como grietas o hendiduras, esquinas o áreas de movimiento. Utilice sitios incluyendo superficies debajo de mesas, mostradores, repisas, cajones y lavaderos; y alrededor de conexiones de tuberías y encima de plafones, dentro de cajas eléctricas, junto o sobre botes de basura, abajo y detrás de estufas y refrigeradores, alrededor coladeras, equipo eléctrico y máquinas.

No aplique Siege® en áreas y / o maquinaria que esté en contacto directo con alimentos. Se puede usar en cuartos de basura, lavabos, drenajes, entradas, vestíbulos de oficinas, closets, cuarto de máquinas, cocheras y cuartos de almacenaje en general.

Para aplicar el gel remueva la tapa del aplicador, ponga la punta sobre la superficie y aplique, vuelva a tapar el aplicador después de que se complete el tratamiento. El cebo se adherirá a superficies sin grasa y sin polvo, el cebo permanecerá palatable a las cucarachas mientras este visible.

Se proveerá un control más rápido si el gel se coloca en poca cantidad en numerosos lugares, que si se hace en grandes cantidades en pocos lugares, especialmente para el control de cucaracha germánica.

La reducción de la población se verá después de una semana o menos, las cucarachas entrarán en estado letárgico, después de ingerir el gel y algunas podrán ser vistas durante horas del día.

Reaplique cuando el cebo ya no sea visible de acuerdo al nivel de infestación, el cual será generalmente a una dosis más baja que la del tratamiento inicial. Se recomienda una inspección visual de los lugares en donde se colocó el cebo una semana después del tratamiento inicial donde se trate de controlar altas infestaciones. Se deba hacer una segunda aplicación si el cebo ya no es visible.

Nota: No aplique el gel en áreas las cuales han sido recientemente tratadas con insecticidas, ya que esto causará que el cebo sea repelente. No coloque el cebo en lugares que son usualmente lavados ya que el cebo será removido por el lavado. No aplique tratamientos en lugares donde las operaciones de limpieza provoquen que se mezcle con alimentos.

