

Fecha de elaboración:	08.09.2023	Fecha de actualización:	08.09.2023
Elaboró	T. SANCHEZ	Revisó	T. GONZALEZ
Identificación de la empresa:	2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, Granada, 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México		
Teléfonos de emergencia:	CHEMTREC +52 55 8526 4930 (24 hr) Lada sin costo 800 681 9531 (24 hr) SINTOX: (55) 98 6659 Lada sin costo: 800 009 2800		
RACUMIN® SUPER			
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”			
Ingrediente activo:			% en peso
Difetialona: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxi-1-benzotriin-2-ona (Equivalente a 0.025 g de i.a./Kg)			00.0025
Ingredientes inertes:			
Cebo, atrayente, colorante y compuestos relacionados			99.9975
TOTAL			100.0000
RSCO-DOM-RODE-516-303-057-0.0025			
Titular del registro: 2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, Granada, 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México “HECHO EN EUA” ® Marca Registrada por Envu RFC: DMV210819NP6		Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, Granada, 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México https://www.mx.envu.com/	
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”			
Se recomienda utilizar ropa protectora, guantes, cubre bocas y gafas protectoras al manipular el producto. No comer, beber, ni fumar al manejar el producto.			
Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa. “MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD”			
En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden presentarse síntomas tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles.			
“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”.			
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”, “EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS”. Guardar y transportar RACUMIN® SUPER en su empaque original debidamente cerrado. “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.			

“PRIMEROS AUXILIOS”

La difetialona es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las hidroxibenzotiopiranonas. Signos y síntomas de intoxicación: inapetencia, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel. Tratamiento y antídoto: adminístrese vitamina K1 (fitomenadiona) como antídoto específico por vía oral, intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroxicumarina. Repítase el tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protrombina. La dosis máxima de vitamina K1 es de 40 mg al día. De ser necesario, realícese transfusión sanguínea.

“ALEJE A LA PERSONA DEL AREA” “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”. “EN CASO DE MALESTAR

POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”. URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos (55) 5598-6659 y (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 800 0092800.

“GARANTIA”

2022 Environmental Science S. de R. L. de C.V. (Envu) garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Envu de su localidad.

“FORMA ADECUADA DE USO” Ubicar los lugares donde los roedores encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo, generalmente a lo

largo de muros, agujeros,

grietas, en o aun lado de madrigueras, rincones, lugares poco accesibles entre el piso y las paredes, detrás de muebles o en sitios donde los roedores o sus excretas hayan sido observadas.

Colocar el contenido de una a dos tapas del bote de RACUMIN® SUPER en los lugares frecuentados por los roedores: Manténgalo abastecido hasta que note la ausencia de éstos.

Para el control de RATAS: colóquese directo a madriguera ó cada 5 a 10 metros. **Para el control de RATONES:** colóquese directo al nido o cada 2

a 3 metros. Manténgase y repóngase la cantidad de raticida por 10 a 15

días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. En caso de nueva infestación de roedores, repítase el tratamiento.

Determinar los lugares donde existe la mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo:

dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.