

CONTRAC® BLOX

CONTRAC Blox es el cebo en el que los técnicos pueden confiar para su uso en cualquier infestación de roedores. CONTRAC Blox es un anticoagulante de una sola ingesta, que es lo suficientemente versátil como para usarse como cebo para bajar infestación o de mantenimiento.

Bromadiolona, un anticoagulante de segunda generación, ha sido considerado por mucho tiempo como

uno de los ingredientes activos más efectivos y rentables para el control de roedores. Ha sido formulado en

bloques, pellets, cereal y cebos blandos (pasta), a una concentración de .005%, haciendo que sea un cebo

versátil para su uso en ratas y ratones. Es uno de los rodenticidas anticoagulantes de

segunda generación (SGARs), que fueron desarrollados después de los anticoagulantes de primera generación

(FGARs) como Rodenticida / Bloque parafinado Bromadiolona RSCO-URB-RODE-511-308-033-0.005

la warfarina, para utilizarse precisamente en especies de roedores resistentes a la warfarina. ****Antídoto: Administrar vitamina K**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	PORCENTAJE EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Bromadiolona: 3-[3-(4'-Bromo(1,1'-bifenil)-4-il)-3-hidroxi-1-fenis-propil]-4-hidroxi-2H-1benzopiran-2-ona (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	0.005%
INGREDIENTES INERTES: Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul	99.995%
TOTAL:	100.00%

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO

CONTRAC® BLOXTM es un rodenticida de acción anticoagulante. Utilícese para el control de roedores común de rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	# DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Ratas	LIGERA A MODERADA	1 a 3	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 m.
Rata noruega Rata negra	SEVERA	4 a 8	
RATONES Ratón doméstico		1	Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.



CONTRAC[®] BLOX

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque. No use el producto en corrientes de agua.

- No coma, beba o fume cuando este manipulando este product.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, o forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado.
- No almacenar en casas habitación.
- Los menores de 18 años no deben manejar este product.
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.


Tratamiento específico.- Administrar vitamina K1, Dosis adultos: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina.

El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales, y la hemorragia haya cesado.

Signos y síntomas de intoxicación: Al ser ingerido por seres humanos puede provocar diarrea y hemorragia por nariz y encías.

Formulado Por:
BELL LABORATORIES, INC.
3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704 USA
www.belllabs.com

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO DE ORDEN
CONTRAC [®] 28g Blox	Cubeta 8kg	65130
CONTRAC [®] 10g Blox	Cubeta 1.8kg	65418



CONTRAC[®] y BLOX[®] son marcas de Bell Laboratories, Inc. Estados Unidos.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

Macro[®]
controlador