

Klerat[®] Cubos
Parafinados

USO URBANO
RSCO-URB-RODE 0501-317-087-0.005

¡ NUEVO RODENTICIDAPERFORADO DE 5 g !

Suculento y mortal para ratas y ratones.



- Elaborado a base de selectos cereales Brodifacoum al 0.005%, el más potente rodenticida anticoagulante de segunda generación contra ratas y ratones plaga, ideal para manejo de la resistencia a otros rodenticidas.
- Monodósico: un pequeño bocado basta.
- Formulación diseñada para alta atractividad y palatabilidad para roedores.
- Gran rendimiento: mini cubos perforados para optimizar el costo de los puntos de cebado.
- Mayor resistencia a la intemperie, uso en interiores o exteriores
- Eficacia comprobada en más de 90 países y registro US EPA
- El único rodenticida con especificaciones de la Organización Mundial de la Salud.
- Amplio margen de seguridad: contiene amargante Bitrex[®] (benzoato de denatonio) para evitar la ingestión accidental y existe antídoto específico para personas y animales.

Controla diferentes tipos de roedores:



Rata noruega o de alcantarilla



Rata negra o del tejado



Ratón doméstico

Klerat[®] es marca registrada de una Compañía del Grupo Syngenta
Bitrex[®] marca registrada de Johnson MattheyPlc

Dosis recomendadas:

PRESENTACIÓN	PLAGA	INFESTACIÓN ALTA	INFESTACIÓN BAJA
Klerat®Cubos parafinados	Rata y ratón	6 bloques cada 3 a 5 metros	1 bloque cada 5 a 10 metros

Klerat® Cubos parafinados: colóquese dentro de cebaderos para incrementar la seguridad de su uso conservarmástiemposuatractividad pararatas yratones.Directoal interior demadriguera.



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (usar protección sobre nariz y boca, guantes de nitrilo, overol y botas de hule). Después de la jornada laboral se deberá lavar con abundante agua yjabón la ropa y equipo de protección de manera separada a la ropa de uso común yguardarseen el sitio de trabajo bajo llave.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO

ESTE PRODUCTO". "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO". "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN". "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA". "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA". "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"."EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTECON EL MÉDICOY MUÉSTRELEESTAETIQUETA" "PRIMEROS AUXILIOS" Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto. Si la espiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si hubo contacto con la piel quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua abundante. Si hubo contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar los lentes de contacto. Si ha ingerido el producto, no provoque elvómito,consiga un médicoinmediatamenteymuéstreleesta etiqueta. "RECOMENDACIONES AL MEDICO". Para mayor información en caso de intoxicación llame a:TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX: Lada sin costo 800-00-928-00, (55) 5598-6659 / 5611-2634, SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIASDELAÑO.

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas. SINTOMAS DE INTOXICACION: KLERAT CUBOS PARAFINADOS al ser ingerido puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hemorragias. En casos graves puede haber moretones, hematomas en las articulaciones, sangre en las heces y la orina. ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECIFICO: Administrar vitamina K1. Dosis para adultos: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales y la hemorragia haya cesado.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y A LA POBLACIÓN: A LOS TRABAJADORES:

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- No inhale el polvo de este producto.
- Use mascarilla apropiada para productos tóxicos.
- Use ropa protectora, zapatos y guantes para uso exclusivo del trabajo y que no se lleven puestos después de éste.
- Si el producto cae al suelo, no lo pise o trate de recogerlo con las manos, aunque lleve los guantes, use una pala para recogerlo.

A LA POBLACIÓN:

En caso de derrame absorba el producto con aserrín, tierra y arena. Disponga la tierra, arena o aserrín que ha absorbido el producto en un lugar seguro. En caso de que se generen vapores, no los inhale

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN INSTALACIONES URBANAS.

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revisar semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando se necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. KLERAT CUBOS PARAFINADOS no causan recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades del producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y reporta la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente.
13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplicaren presencia de niños y animales domésticos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en presencia de niños y animales domésticos.

Elaboró: MMVZ. Ma. Teresa de J. Ambriz Barajas Fecha 24 /04/2024

Syngenta Agro, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1431, Piso 12. Col. Insurgentes Mixcoac. Del. Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México.



Control de plagas • Ferretería • Desinfección

Calle Piña No. 1377 Col. Del Fresno
Guadalajara Jalisco C.p. 44900
atencionaclientes@macropres.com

Contáctenos:

01 (33) 3810 73 99

01 (33) 4444 4829

www.macropres.com