



CLASIFICACIÓN	REGISTRO
<ul style="list-style-type: none"> • Insecticida y/o Acaricida • Piretroide tipo 2 • Lambda cyhalotrina • Polvo humectable (PH) 	USO URBANO: RSCO-URB-INAC-177-307-002-10 USO SALUD PÚBLICA:

Mayor eficiencia y largo efecto residual contra insectos, arañas y alacranes. Polvo humectable práctico y económico para un mejor control de plagas y vectores. Eficacia constatada en México para el control de vectores. Especificación OMS e incluido en la lista Prequalification Vector Control (PQ-VC), así como en Roll Back Malaria/OMS. Rotación para manejo de la resistencia Grupo 3 A IRAC.

RSCO-URB-21-2015

Composición porcentual	Porcentaje en peso
Ingrediente activo Lambda cyhalotrina: Alfa-Ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro -3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato, a 1:1 de los isómeros (Z) – (1R, 3R),S-ester y (Z)-(1S,3S)-R-ester; también (R) Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y (S)-Alfa-ciano-3- fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 102 g de i.a. / L a 20°C). Nominal:	10.000 %
Ingredientes inertes Estabilizadores, adyuvante y diluyente (Uso Urbano) Surfactantes y vehículos (Uso en Salud Pública)	90.000 %
Total	100.000 %

Información general: Icon ®10PH, formulación en polvo humectable a base de Lambda cyhalotrina de Syngenta, activo clasificado como insecticida piretroide tipo 2, de cuarta generación, con especificaciones para el ingrediente activo y la formulación de la Organización Mundial de la Salud (WHOPES) e incluido en la lista Prequalification Vector Control (PQ-VC) desde 2018 y en el portafolio de productos Roll Back Malaria /OMS. Evaluado exitosamente en México por investigadores recomendados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) e incluido con el registro de Uso en Salud Pública (USP) “en la Lista de Productos y Equipos Recomendados para el combate del insecto vector, para uso en los programas de salud pública”. Es una herramienta importante para la rotación entre grupos químicos considerada por el International Resistance Action Committee (IRAC) para el Manejo de la Resistencia a Insecticidas (IRM). Se comercializa mundialmente con las marcas Icon® 10PH, Icon® 10WP e Icon® 10PM. Existen dos registros en México: Uso Urbano y para Uso en Salud Pública, consulte las etiquetas de los productos.

Icon® 10PH a las dosis recomendadas por la OMS confiere protección residual prolongada

hasta por

6 meses, tanto en interiores como en exteriores para el control del más amplio espectro de artrópodos: insectos voladores, rastreros y arácnidos, incluyendo los de importancia en

Salud
Pública.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno



Las plagas se intoxican por contacto e ingestión y tiene buen efecto de derribo sobre las plagas, incluyen arañas y alacranes, con la ventaja de utilizar la misma dosis para el amplio espectro de más de 25 plagas. Icon® 10PH es compatible con diferentes equipos y técnicas de aplicación para el control de vectores y arácnidos importancia en Salud Pública, así como el control de plagas urbanas.

Icon® 10PH, aplicación profesional y limpia, sin olores desagradables ni manchas.

Instrucciones de uso:

Lea la etiqueta, calibre siempre su equipo de aplicación y consulte al área técnica de Syngenta.

Uso Urbano: Un sobre de 25 g para 4 litros de agua.

Uso Salud Pública: Aspersión manual para rociado intradomiciliar (Vectores/CENAPRECE); recomendaciones para rendimientos adecuados: la boquilla Teejet® 8002 E o equivalente, presión de 25-55 psi, para un gasto de 760 ml / min., y considerando la dosis alta del ingrediente activo recomendada por la OMS para 6 meses de residualidad: 30 mg de Lambda cyhalotrina de Syngenta por m², equivale a diluir 75 g de Icon® 10PH POR 10 LITROS DE MEZCLA CON AGUA, para un rendimiento promedio de 250 m² ó 1,250 metros lineales en banda, una velocidad de aplicación de 2 m en 2.2 segundos y a una distancia de la boquilla del muro de 45 cm para abanicos de 75 cm de franja de rociado y 5 cm de traslape. La modificación de estas constantes modifica el rendimiento. Para el control de plagas urbanas calibre el equipo de acuerdo a residualidad deseada.

- Aspersión con bomba motorizada; para rociado rápido (Vectores.CENAPRECE) y plagas urbanas, calibre el equipo de acuerdo a residualidad deseada: 20 mg a 30 mg de ingrediente activo por m² (OMS).
- Inyección a grietas y hendiduras: solo con aditamento de popote para boquilla de aspersor manual, NO se utilice con equipos microinyectores.
- Pincelamiento: aplicación con brocha.

Medidas precautorias: Agregue al tanque del equipo la mitad de agua limpia requerida para la aplicación, filtrando utilizando una malla fina. Utilice tijeras o navaja, nunca la boca para abrir el sobre del ICON 10 PH, hágalo con precaución, para evitar cortar el sobre hidrosoluble que se encuentra en el interior (dentro del cual se encuentra el producto). Vierta dentro del tanque el sobre hidrosoluble o sobres requeridos para la dilución recomendada de acuerdo al vector y técnica de aplicación descritos en la tabla de dosificación de esta etiqueta, (no abra ni perforo el sobrecito hidrosoluble, depósitelo directamente en el tanque). Finalmente agregue el resto de agua filtrada y cierre herméticamente el equipo de aplicación para evitar derrames. Mezcle homogéneamente, agitando el equipo vigorosamente. Los polvos humectables requieren de reagitación durante el proceso de aplicación, debido a que físicquímicamente forman mezcla con agua, no soluciones.

No se mezcle este producto en la misma bomba con otros plaguicidas. Evite el uso de agua sucia y con pH alcalina con los plaguicidas. Confine para disposición final, de acuerdo a la normatividad vigente, los empaques secundarios del producto.

Tiempo de reentrada al sitio tratado: Inmediatamente que seca la aplicación. No aplique plaguicidas en presencia de personas y animales domésticos.

Establezca esquemas de rotación con otros modos de acción como Optigard® Flex Liquid, Demand® Duo, Actellic® Vectores, Actellic® 300CS.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno



Emergencias SINTOX/ PROCCYT: Servicio las 24 horas de los 365 días del año. Área Metropolitana SINTOX: (55) 55 98 66 59 y (55) 56 11 26 34; LADA Sin Costo 800 009 28 00. En caso de intoxicación consulte al médico. Signos y síntomas: por uso inadecuado del producto pueden presentarse dolor de cabeza, náuseas, vómito, vértigo, síndrome de susceptibilidad subjetiva a piretroides (sensación subjetiva facial) que algunos aplicados pueden presentar. Antídoto y tratamiento específico: Tratamiento sintomático, terapia de sostén; fenobarbital, diazepam para el manejo de convulsiones. En caso de intoxicación en animales, consulte inmediatamente al Médico Veterinario.

Presentación: Empaque de 4.5 kg, conteniendo 180 sobres hidrosolubles de 25 g cada uno.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

