



MATA
HORMIGAS GEL

syngenta

FICHA TÉCNICA

“El control de hormigas claramente superior”



Cebo insecticida en gel transparente, discreto y sin olor.

- Neonicotinoides de segunda generación a base de Thiamethoxam (Modo de acción 4 A –IRAC*, 2020).
- Registro Doméstico: RSCO-INAC-0101U-0719-092-0.01
- Categoría toxicológica 5 Banda Verde
- Jeringa de 10 gramos con punta dosificadora.

	Porcentaje en peso
Ingrediente activo Thiamethoxam (Tiametoxam): (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinon-4-ilideno-(nitro)amina. (Equivalente a 0.126 g de i.a./kg a 20°C). Nominal:	0.010%
Ingrediente activo Thiamethoxam (Tiametoxam): 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinon-4- ilidino-N-nitroamina; también (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinon-4- Ingredientes inertes Atrayente, conservadores, espesantes (complejo gelificante), neutralizante, agente aversivo y disolvente.	99.990%
Total	100.00%

- Aplicaciones impecables: libres de escurrimientos, manchas y sin efecto repelente. Multiplica el control: contiene atractivos ingredientes para las hormigas, para que lo consuman vorazmente y así inicie la cadena de intoxicación por transferencia a partir de las primeras hormigas que lo ingieren a las demás del nido, incluyendo a la o las reinas, logrando un control masivo del hormiguero.
- Controla diferentes tipos de hormigas:

Nombre común	Nombre científico
Hormiga negra	<i>Lasius spp.</i>
Hormiga argentina	<i>Linepithema humilis</i>
Hormiga loca	<i>Paratrechina longicornis</i>
Hormigaolorosa ofantasma	<i>Tapinoma sessile</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus spp</i>
Hormiga del pavimento	<i>Tetramorium caespitum</i>
Hormiga acróbata	<i>Crematogaster spp</i>
Hormiga de ladrona	<i>Solenopsis molesta</i>



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

Macro
controlador


RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN AREAS DOMESTICAS:

Este producto debe ser aplicado con su jeringa, en pequeñas porciones en grietas, zoclos de paredes, agujeros en esquinas de ventanas y puertas, por las orillas estufa, fregadero, refrigerador, lavado, WC, por las orillas de las paredes y en los lugares por donde circulan y en donde se concentran los nidos de los insectos. Consulte los pictogramas indicativos de aplicación en el instuctivo. La dosis es 1 gramo por punto de cebado, pero puede fraccionarse en pequeñas gotas o líneas de 5 mm de largo. Una línea de 5 mm equivale a 0.1 de gramo y 5 cm equivale a 1 g de producto.

- Limpie el área infestada lo mejor posible y elimine el cochambre.
- Retire la basura y repare las fugas de agua que sirven de alimento y fuente de agua a los insectos.
- No aplique insecticidas del grupo piretroides sobre las áreas tratadas con el cebo porque evitan que los insectos se acerquen a comer el cebo.

Aplicación: Retire la tapa de la jeringa del cebo con las manos, cuidadosamente y utilice guantes.

- Inspeccione la cocina, el baño y habitaciones donde se observa circulación de los insectos hacia sus nidos o refugios.
Identifique de ser posible nidos y refugios, pequeñas grietas en muros, macetas y
- jardineras, áreas del perímetro de la casa o edificio, cajas de los apagadores y contactos de luz, alrededor de tuberías de agua y drenaje, zoclos, armarios, alacenas. Coloque pequeñas gotas un lado de la ruta de los insectos, a un lado de las placas de
- los apagadores y las grietas pueden servir de refugio, atrás del mobiliario de cocina y baño, alrededor de la tubería, en los gabinetes donde se les ha visto circular, en la entrada de los nidos, (ver ilustraciones). No contamine las superficies que tienen contacto directo con alimentos.
Revise semanalmente los puntos de cebado para reemplazarlos o resurtirlos cuando
- sea necesario. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones. Se sugiere el uso de cebaderos para hormigas para mayor control del cebo.



“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO”: Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá evitarsu ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

- “ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”.
- “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “NO REUTILICE ESTE ENVASE”.
- “EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.
- No coma, beba, ni fume durante el uso y manejo de este producto.
- Klerat® Mata Hormiga Gel contiene un aversivo, que es una amargante preventivo de la ingestión humana accidental.
- Proteja la piel con guantes.
- Evite la ingestión de este producto, no lo huela y no lo aplique en guantes.
- Evite que los niños, animales domésticos y aves tengan acceso a los puntos de cebado. Evite la contaminación de alimentos de consumo humano y animal.
- Después del tratamiento, almacene y resguarde este producto en su envase original y fuera del alcance de los niños y animales.
- Antes de comer, beber, fumar o dedicarse a otra actividad, lávese las manos con abundante agua y jabón.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie, a temperaturas por arriba de 0°C y por debajo de 35°C,

“PRIMEROS AUXILIOS”: “ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA”. “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”.

Como medidas generales para los plaguicidas:

- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico.
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna picadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona.
- Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico para Thiamethoxam (nicotinoide). El médico debe administrar tratamientos sintomáticos al paciente.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”.

No se conocen signos de intoxicación en humanos, no se han presentado casos en seres humanos. Recomendaciones para el tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX): Lada sin costo 800 00 928 00, (55) 5598-6659 / 5611-2634 SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno


Macro
controlador