ATRAZINA 500 SC DIABLO

Atrazina

Herbicida	Suspensión concentrada	Triazinas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-HEDE-0204-258-064-45

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		% (p/p)
Ingrediente Activo.		
Atrazina (6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3-5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 500 g de i.a./l a 20°C		45.00
Ingredientes Inertes.		
Emulsificante, antiespumante, anticongelante, espesante antiséptico, estabilizador, agua		55.00
	TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.
ATRAZINA 500 SC DIABLO es un herbicida formulado como suspensión concentrada. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza de hoja ancha y angosta

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo (SL)	Aceitilla *(Bidens pilosa)* Quelite *(Amaranthus hibridus)* Zacate cadillo *(Cenchrus equinatus)* Pata de gallo *(Eleusine indica)* Zacate de agua *(Echinochloa colonum)*	2.0 – 4.0	Realizar una aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo.
	Hierba golondrina *(Euphorbia hirta)*	3.0 - 4.0	

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para preparar el producto, vacíe la dosis recomendada de ATRAZINA 500 SC DIABLO en el tanque de mezclado o del equipo, conteniendo las ¾ partes del volumen de agua requerido para lograr una buena cobertura, agite y posteriormente agregue el agua faltante. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para mantener uniforme la suspensión. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 200 a 400 litros de agua por ha. Use el equipo de protección overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla
Como la acción del producto depende de la humedad del suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.
En aplicación pre-emergente: aplique ATRAZINA 500 SC DIABLO en los días que sigue a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien mullido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillean y mueren dentro de los 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

CONTRAINDICACIONES.

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/ha de ATRAZINA 500 SC DIABLO para evitar residuos en el suelo. Los campos tratados con ATRAZINA 500 SC DIABLO no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta transcurridos de 4 a 6 meses. Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo. No deberá sembrarse alfalfa o donde se siembre cultivos asociados.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda ATRAZINA 500 SC DIABLO, en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previo a la aplicación”

MANEJO DE RESISTENCIA. “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.