



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



URBATRINE 2.5 FLOW

Deltametrina

Insecticida

Suspensión Concentrada

Piretroide

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0119-0443-064-2.5

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DELTAMETRINA.

(S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato
Equivalente a 26.878 g de I.A/L a 20°C

2.5

Ingredientes Inertes.

Agente dispersante, diluyentes, humectantes e inertes

97.5

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

URBATRINE 2.5 FLOW, es un insecticida piretroide, con efecto inicial y residual. Actúa por contacto e ingestión (amplio espectro de acción) en el control de moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, chinches, arañas, pulgas y alacranes en interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias, clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas, cines y teatros.

REG_FT_001

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 1 de 3



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Usar overol, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla.
- Descontaminar el Equipo de Protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Moscas (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>) Mosquitos (<i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>) Hormigas (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis spp</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>) Chinches (<i>Cimex lectularius</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex Irritans</i>) Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blara orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>)	10	1 Litro de mezcla para 33 m2 de superficie ó 165 m lineales en banda
Arañas (<i>Latrodectus spp</i>) Arañones	20	
(<i>Centruroides spp</i> , <i>Vejovis spp</i>)	20-60	

TIEMPO DE REENTRADA.

Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 10 minutos de terminada la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas. Para acabados rústicos aplicar a intervalos cortos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Mezclar con agua de acuerdo a las dosis señaladas en el cuadro. Agitar vigorosamente hasta tener una suspensión homogénea. Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente. Aplicar con cualquier aspersor. Para sitios elevados o extensos puede utilizar motoaspersora y equipos eléctricos (para el tratamiento de hendiduras y grietas)

CONTRAINDICACIONES.

REG_FT_001

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 2 de 3



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

