



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



GAMO 1%

Imidacloprid

Insecticida

Granulado

Cloronicotinilos

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0199-0380-005-001
TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
Imidacloprid: (E) -1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N- nitroimidazolidin-2-ilidenamina (Equivalente a 10 g de i.a./Kg)	1.00
Ingredientes Inertes.	
Vehículo, material inerte y colorante	99.00
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

GAMO 1%, es un insecticida que actúa en forma sistémica, por contacto e ingestión.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal adecuado y completo, por ejemplo: gorra de algodón o sombrero, mascarilla completa de protección contra polvos y vapores tóxicos con filtro combinado, p. e. ABK-P, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Procure realizar la preparación de la mezcla siempre a favor del viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado, el equipo de protección personal se debe lavar y almacenar en el lugar de trabajo. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de cada día de trabajo, báñese adecuadamente y póngase ropa limpia.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Cultivo	Plaga Nombre común (Nombre científico) Mosca Pinta (<i>Aeneolamia postica</i>)	Dosis kg/ha	Observaciones
Caña de azúcar (1)		20	Quando las primeras ninfas y/o adultos se observen iniciar el tratamiento. Realizar una aplicación a la base de la planta.

(1) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

GAMO 1% es un insecticida granulado, que se presenta listo para su aplicación.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Por ser un insecticida en forma granulado, la aplicación deberá realizarse discretamente sobre el cultivo. Si la aplicación es vía terrestre dirigir la aplicación a la base de las plantas con equipo terrestre (aspersora de motor), ya que es fácilmente absorbido por vía radicular.

Indicar aplicaciones cuando se detecten las primeras incidencias de ninfas y adultos de mosca pinta o salivazo.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en horas de calor intenso (temperaturas mayores de 35°C), ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 8 Km/hora). La eficacia del producto puede disminuir si llueve inmediatamente después de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

Este producto no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

